

## Инструкции по применению

### Анафтин® Гель

Анафтин® Гель помогает облегчить боль вызванную незначительными травмами полости рта, такими как травмы при афтозном стоматите, афтозные язвы, а также незначительными поражениями, созданными стоматологическими аппаратами и протезами. Он также показан при диффузных афтозных язвах.

#### Механизм действия:

Анафтин® Гель содержит поливинилпирролидон (ПВП) и гиалуроновую кислоту, которые образуют защитную пленку, прилипающую к полости рта, защищая пораженные области путем механического барьера и, таким образом, облегчая боль, вызванную открытыми нервными окончаниями. Гиалуроновая кислота и *Алоэ вера*, которые входят в его состав, способствуют естественному заживлению пораженных тканей.

#### Инструкции по применению:

Используйте 1 или 2 капли геля для покрытия всей язвы или поражения рта. Избегайте прямого контакта между аппликатором и зоной поражения. Не прикасайтесь к повреждению языком в течение как минимум 2 минут, чтобы образовалась защитная пленка. После каждого применения, закройте назад колпачком. Для достижения оптимального результата, избегайте употребления пищи или питья, по крайней мере, в течение часа после нанесения геля.

Используйте 3-4 раза в день или чаще, если есть необходимость.

#### Состав:

*Вода*, поливинилпирролидон (ПВП), мальтодекстрин, пропиленгликоль, гидрированное касторовое масло ПЭГ-40, ксантановая камедь, сорбат калия, бензоат натрия, гиалуронат натрия, ароматизатор, бензалконийхлорид, динатрий ЭДГА, сахарин натрия, дикалий глицирризин, *Aloe Barbadensis*.

#### Меры предосторожности:

Каждый тюбик Анафтин® Геля следует использоваться только одним пациентом для избежания перекрестного загрязнения аппликатора и геля. Использование Анафтин® Геля противопоказано пациентам с историей известных реакций гиперчувствительности на любой из эксципиентов. Если вы беременны, проконсультируйтесь с вашим врачом перед

использованием продукта. Если вы часто страдаете язвами полости рта, рекомендуется консультация врача.

**Предупреждения и меры предосторожности:**

Не использовать после истечения срока годности или в случае если тюбик кажется поврежденным или протекающим.

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить при комнатной температуре, защищенным от прямого тепла. Не замораживать.

**Содержит:**

8 мл.

**Производитель:**

Alliance Pharma Srl,  
Viale Restelli 5,  
20124 Милан, Италия

**Дистрибьютор:**

BERLIN-CHEMIE AG  
(MENARINI GROUP),  
Glienicker Weg 125,  
12489 Берлин, Германия

**Дата пересмотра текста:**

09/2016